

# Studio clinico sugli stent a eluizione di farmaco Zilver<sup>®</sup> PTX<sup>™</sup>

---

Lo studio clinico sugli stent a eluizione di farmaco Zilver PTX si sta svolgendo in centri di ricerca di diversi Paesi del mondo e mira a determinare se uno stent rivestito di paclitaxel è in grado di trattare con successo le ostruzioni dell'arteria femoro-poplitea (la principale arteria della coscia) sopra il ginocchio e di contribuire a impedire che col tempo le arterie si restringano nuovamente.

Seguono alcune domande da rivolgere al medico.

- 1 La mia arteriopatia periferica è peggiorata a tal punto che i cambiamenti dello stile di vita e la terapia farmacologica non sono più efficaci?
- 2 I sintomi della mia arteriopatia periferica rientrano nella categoria Rutherford 2 o in una classe superiore, vale a dire che i sintomi sono da moderati a gravi?
- 3 Sono disposto a partecipare a uno studio clinico e a seguire un programma di follow-up rigoroso e regolare?
- 4 A causa della mia arteriopatia periferica mi è stato mai impiantato uno stent?
- 5 La mia arteriopatia periferica è a carico dell'arteria femorale superficiale o dell'arteria sopra il ginocchio?

Lo studio clinico sugli stent a eluizione di farmaco Zilver PTX si sta svolgendo presso diversi centri di ricerca statunitensi, nonché in centri in Asia, Canada, America Latina ed Europa. Per maggiori informazioni su questo studio clinico o per individuare il centro partecipante più vicino, visitare il sito [www.zilverptx.com](http://www.zilverptx.com).