

Estudio del stent de elución de fármacos Zilver[®] PTX[™]

El estudio del stent de elución de fármacos Zilver PTX se está llevando a cabo en centros de todo el mundo para determinar si un stent recubierto con paclitaxel es eficaz para tratar obstrucciones de la arteria femoropoplítea (la arteria principal del muslo) situadas por encima de la rodilla y para ayudar a evitar que las arterias se estrechen con el tiempo.

A continuación encontrará algunas preguntas que puede comentar con su médico.

- 1 ¿Ha progresado mi arteriopatía periférica hasta el punto en que los cambios en el estilo de vida y el tratamiento farmacológico ya no son eficaces?
- 2 ¿Se pueden clasificar los síntomas de mi arteriopatía periférica en la categoría 2 o más de Rutherford (es decir, son síntomas de moderados a graves)?
- 3 ¿Estoy dispuesto a participar en un estudio clínico y a cumplir un programa de seguimiento exhaustivo y regular?
- 4 ¿He recibido anteriormente algún tratamiento con stent para la arteriopatía periférica?
- 5 ¿Mi arteriopatía periférica se localiza en la arteria femoral superficial o en la arteria que pasa por encima de la rodilla?

El estudio del stent de elución de fármacos Zilver PTX se está llevando a cabo en varios centros de Estados Unidos, así como en centros de Asia, Canadá, Latinoamérica y Europa. Si desea obtener más información sobre el estudio o buscar un centro participante próximo, inicie una sesión en www.zilverptx.com.